




COVID-19 – вакцинація ЗА чи ПРОТИ


В. Черкасова

**к.мед.н., лікар-епідеміолог
Львівського Центру легеневого здоров'я**



- За добу 21 вересня 2021 року в Україні зафіксовано **6 754** нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19
- Госпіталізовано – **2 175** осіб;
- Летальних випадків – **105**;
- Одужало – **2 095** осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (**449**) та Одеській (442) областях.




ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я


Подобова кількість підтверджених випадків у Львівській області 22.03.2020 – 22.09.2021




Подобова кількість госпіталізацій у Львівській області 01.05.2020 – 22.09.2021




Подобова кількість пацієнтів на стацікуванні у Львівській області 01.05.2020 – 22.09.2021




Щомісячна кількість госпіталізацій до Центру легеневого здоров'я, квітень 2020 – вересень 2021



Щомісячна кількість смертей в Центрі легеневого здоров'я, квітень 2020 – вересень 2021



Розподіл випадків за статусом вакцинації в Центрі легеневого здоров'я, вересень 2021



1 доза – 9 осіб
2 дози – 13 осіб

CoronaVac – 10
AstraZeneca – 5
Moderna – 3
Pfizer – 4

Все про вакцину AstraZeneca (Covishield, SKBio)



Тип вакцини:
векторна вакцина



Розробник:
британсько-шведська
фармацевтична компанія
AstraZeneca та
Оксфордський університет



Ефективність:
63% (згідно з тимчасовими
рекомендаціями Стратегічної
консультативної групи експертів ВООЗ)



Кількість доз:
2



Інтервал між введеннями:
4-12 тижнів



Температура зберігання:
+2...+8



Країна виготовлення:
Індія, Південна
Корея



Схвалена:
ВООЗ, ЄС, Великою
Британією, Канадою та
Індією для екстреного
використання



Можливі реакції на щеплення*:
почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції,
лихоманка чи озноб, головний біль, біль
у м'язах чи суглобах, нудота, втомлюваність,
безсоння, збільшені лімфатичні вузли
*Ці реакції є нормальними та минають за кілька днів
після вакцинації

Як працює:

Використовує модифікований вірус (вектор), щоб доставити специфічні білки коронавірусу в клітини організму людини. Цей білок активує імунну відповідь. В такий спосіб вакцина формує імунітет, не викликаючи хвороби.

Протипоказання:

- ▶ Важка алергічна реакція на попередню дозу
- ▶ Гіперчутливість до одного з компонентів
- ▶ Температура тіла вище 38,5°C

Контакт-центр: 0 800 60 20 19

vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech



Тип вакцини:
мРНК-вакцина



Розробник:
фармакологічний концерн
Pfizer (США)
біотехнологічна компанія
BioNTech (Німеччина)



Ефективність:
95%



Кількість доз:
2



Інтервал між введеннями:
21 день



Температура зберігання:
від -60 до -80°C



Країна виготовлення:
США, ЄС



Схвалена:
Схвалена США, Канадою,
ЄС, Великою Британією,
Ізраїлем та ін. для
екстреного використання



Можливі реакції на щеплення*:
почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції,
лихоманка чи озноб, головний біль, біль
у м'язах чи суглобах, судоми, нудота,
втомлюваність, безсоння, збільшення
лімфовузлів

*Ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації

Як працює:

Містить молекули мРНК, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу. Ця мРНК потрапляє в клітини організму людини й надає їм своєрідну «інструкцію», як створити цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині та виробляє антитіла до нього. Так організм вчиться, як захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом.

Протипоказання:

- ▶ Гіперчутливість до одного з компонентів
- ▶ Важка алергічна реакція на вакцини в минулому
- ▶ Температура тіла вище 38,5°C

Контакт-центр: 0 800 60 20 19

vaccination.covid19.gov.ua



Вакцина Moderna/mRNA-1273/Spikevax



Тип вакцини

мРНК-вакцина



Розробник

американська
фармацевтична
компанія Moderna



Ефективність

94.1%¹

¹ згідно з рекомендаціями Стратегічної консультативної групи експертів (SAGE) при ВООЗ від 15.06.2021



Кількість доз

2



Інтервал між введеннями

28 днів



Країна виготовлення

США



Термін і умови зберігання:

7 місяців за температури від -25 °C до -15 °C

30 днів за температури від 2 °C до 8 °C

24 годин за температури від 8 °C до 25 °C



Можливі реакції на щеплення*

почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції, лихоманка чи озноб, головний біль, біль у м'язах чи суглобах, збільшення лімфатичних вузлів, нудота чи блювання, втомлюваність, запаморочення

*Ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації. Якщо ви відчуваєте дискомфорт або реакції не проходять, зверніться до лікаря.



Схвалена

ВООЗ для екстреного використання

Як працює:

Містить молекули мРНК, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу. Ця мРНК потрапляє в клітини організму людини й надає їм своєрідну «інструкцію», як створити цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині та виробляє антитіла до нього. Так організм вчиться, як захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом.

Протипоказання:

- ▶ Гіперчутливість до одного з компонентів
- ▶ Температура тіла вище 38°C

Контакт-центр: 0 800 60 20 19

vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Міф X

Вагітних
не можна
щепити проти
COVID-19

Правда ✓

Вагітні можуть
щепитися
проти COVID-19
мРНК-вакцинами,
особливо якщо
вони мають
супутні хвороби
чи високий ризик
захворіти
на COVID-19

Перевірена інформація на
vaccination.covid19.gov.ua



Вакцина CoronaVac/Sinovac Biotech



Тип вакцини

інактивована
вакцина



Розробник

китайське фармацев-
тичне підприємство
Sinovac Biotech



Ефективність

83,5% після щеплення двома дозами*

*за результатами досліджень, наявних
на 25.03.2021



Кількість доз

2



Інтервал між введеннями

14–28 днів



Можливі реакції на щеплення*

почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції,
лихоманка чи озноб, головний біль, біль у м'язах
чи суглобах, біль у животі, біль у горлі, кашель
чи нежить, нудота чи блювота, діарея,
втомлюваність, сонливість, алергічні реакції
на шкірі, слизовій оболонці, склерома, спазми
м'язів, набряки повік, почервоніння очей

*Ці реакції є нормальними та минають за кілька днів
після вакцинації



Країна виготовлення

Китай



Схвалена

Туреччиною, Бразилією,
Китаєм, Домініканською
Республікою, Індонезією,
Мексикою, Чилі, Таїландом
та іншими для екстреного
використання



Температура зберігання

+2...+8

Як працює:

Містить у своєму складі інактивованій (тобто «вбитий») вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Це безпечна технологія, яка успішно застосовується для виготовлення вакцин від грипу, тифу, холери, коклюшу, поліомієліту та дифтерії.

Протипоказання:

- ▶ Гіперчутливість до одного з компонентів
- ▶ Важка алергічна реакція на вакцини в минулому
- ▶ Серйозні захворювання нервової системи (поперечний мієліт, синдром Гієна-Барре, демієлінізація)
- ▶ Температура тіла вище 38,5°C
- ▶ Вагітність та годування грудьми
- ▶ Важкі хронічні захворювання

Контакт-центр: 0 800 60 20 19

vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Міф X

Вакцинам
китайської фірми
Sinovac Biotech
не можна
довіряти.

Правда ✓

Sinovac Biotech –
професійна
компанія, їй
можна довіряти.

На ринку – з 1999 р.
Виробляє до 500
млн вакцин/рік.
Вакцини схвалені
у 34 країнах світу.



Вакцинація
від COVID-19

Інтервал між введенням першої та другої дози вакцин

відповідно до інструкції



**CoronaVac/
Sinovac**
14–28 днів



Comirnaty/Pfizer
21 день



Moderna
28 днів



AstraZeneca
4–12 тижнів

vaccination.covid19.gov.ua

Вакцинація проти COVID-19 людей з хронічними хворобами

Якщо ви маєте:

- ▶ гіпертонію
- ▶ цукровий діабет
- ▶ астму
- ▶ онкологію
- ▶ аутоімунне захворювання
- ▶ ВІЛ-інфекцію
- ▶ гепатит
- ▶ іншу хронічну хворобу

**Вам необхідний захист від COVID-19.
Його може дати вакцинація.**

Щеплення для вас є безпечним!

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Вакцинація проти COVID-19 людей з хронічними хворобами

Якщо ви приймаєте препарати, що впливають на імунну систему, або боїтеся, що стан вашого здоров'я може бути протипоказанням до вакцинації, порадьтеся зі своїм лікарем.

Протипоказання до всіх вакцин проти COVID-19:

- Тяжка алергія до одного з компонентів
- Температура тіла вище 38,5°C
- Вагітність (вакцинація може бути проведена для медичних працівниць)

Більше можна дізнатися з **інструкцій до вакцин** на dec.gov.ua

Обов'язково **повідомте лікаря**, який оглядає вас перед щепленням, про свої **хронічні хвороби** та про будь-які **алергічні реакції**, що були раніше.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua




МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

**Чи можна робити
щеплення проти COVID-19
одночасно з іншими
плановими щепленнями?**

Ні, не можна. В Україні
вакцинацію проти COVID-19
не роблять в один день
з іншими плановими
щепленнями.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



 **МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ**

**Провели щеплення
від іншої інфекційної
хвороби.**

**Коли тепер можна
вакцинуватися
від COVID-19?**

Через 14 днів.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

**Зробили вакцинацію
від COVID-19.**

**Коли можна робити інші,
планові щеплення?**

**Через 14 днів після
другої дози вакцини
проти COVID-19.**

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Ввели вакцини від COVID-19 та від інших інфекцій з інтервалом, меншим за 14 днів. Чи спрацюють вакцини?

Так, спрацюють. Введені дози зараховують. Вводити додаткові дози не потрібно.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Зробили щеплення проти COVID-19, але раптово виникла потреба в екстреній вакцинації від іншої хвороби, приміром від сказу.

Чи можна її робити і коли?

Жодних інтервалів витримувати не потрібно. Необхідна екстрена вакцинація – робіть.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua




МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

**Якщо я контактував/ла
з хворою на COVID-19
людиною, чи треба мені зробити
термінове щеплення проти
коронавірусної хвороби?**

**Ні, екстрена вакцинація проти COVID-19
для постконтактної профілактики
не рекомендується.** Оскільки середній
інкубаційний період COVID-19 становить
4-5 діб, малоймовірно, що доза вакцини
проти COVID-19 забезпечить адекватну
імунну відповідь протягом інкубаційного
періоду.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



 **МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ**

Чи треба перед вакцинацією проти COVID-19 робити обстеження чи аналізи, як-от загальний аналіз сечі чи крові, або міряти тиск?

Ні, не треба у разі відсутності інших підстав поза вакцинацією. Зокрема не потрібно робити ПЛР-тест чи аналіз на антитіла до COVID-19 перед чи після щеплення.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Міф X

Перед або після щеплення на COVID-19 варто зробити тест на антитіла до SARS-CoV-2, щоб зрозуміти чи є в мене захист від коронавірусу

Правда ✓


Робити тести на антитіла до коронавірусу не має сенсу. Їхні результати не дозволяють зробити висновок про рівень імунного захисту людини

Якщо в мене вже був COVID-19 і я одужав/-ла, чи потрібно мені вакцинуватися?

Так. Зважаючи на серйозні ризики для здоров'я і те, що можна повторно заразитися COVID-19, потрібно вакцинуватися, навіть якщо ви перехворіли. Наразі достеменно невідомо, наскільки довго зберігається набутий імунітет. Вакцинація – надійний захист проти COVID-19.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



 **МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ**

**В мене алергія на пилок чи пил.
Мені можна вакцинуватися
проти COVID-19?**

Так, можна.

Побутова чи сезонна алергії не є протипоказанням для вакцинації взагалі, зокрема проти COVID-19.

Люди з полінозом чи алергійним ринітом **можуть вакцинуватися навіть в період загострення хвороби.**

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

**Що робити, якщо я не знаю,
чи є в мене алергія на щось
зі складу вакцини?**

Тяжка алергічна реакція на вакцину,
така як анафілактичний шок, **вкрай рідкісна.**
Вона може проявитися в перші секунди чи
хвилини після щеплення. Саме тому вас
попросять залишитись у пункті щеплення
ще на пів години, щоб у разі серйозної
алергічної реакції (анафілактичного шоку)
вам надали вчасну і правильну медичну
допомогу.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

**Які є обмеження щодо
вакцинації проти COVID-19
людей з алергією
в анамнезі?**

**Якщо ви знаєте, на що у вас алергія,
ознайомтеся зі складом вакцини в інструкції
на сайті Державного експертного центру
МОЗ України www.dec.gov.ua, на сайті
vaccination.covid19.gov.ua та запитайте
про нього в медпрацівників, які проводять
вакцинацію.**

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Як вакцинують проти COVID-19 людей з автоімунними/ системними захворюваннями?

Застереження у випадку вакцинації людей з імуносупресією пов'язані не з безпекою (можливими реакціями на вакцину), а з ефективністю вакцинації для них.

У таких людей імунна відповідь на вакцину може бути не оптимальною. Незважаючи на це, людям з імуносупресією рекомендується вакцинуватися від COVID-19. Тим пацієнтам, які ще не отримують лікування, в ідеалі рекомендують **отримати щеплення за два тижні до початку планової імуносупресивної терапії.**

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

**Чи можна вакцинувати
проти COVID-19
ВІЛ-позитивних людей?**

Так, можна і треба.

Люди з ВІЛ у групі ризику щодо
тяжкого перебігу COVID-19.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Чи можна вакцинувати людей з онкологічними хворобами?

Так. Такі люди в групі ризику і можуть важко перехворіти на COVID-19 або померти.

Вакцини не можуть спричинити захворювання навіть на тлі імуносупресії, бо не є живими «повноцінними» вірусами.

Втім, імуносупресія може означати, що вакцинація не матиме належного ефекту. Попри це, **якщо у вас буде шанс зробити щеплення, краще вакцинуватися, це шанс захиститися.**

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Вакцинація проти COVID-19 осіб з онкологією

Терапія

Коли можна щепитися

Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин:

- Алогенна трансплантація
- Аутогенна трансплантація
- Клітинна терапія (наприклад, CAR T-cell)

Через ≥ 3 місяці

ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНА ПАТОЛОГІЯ

Інтенсивна цитотоксична хімієтерапія

Після відновлення абсолютної кількості нейтрофілів

Порушення функції кісткового мозку внаслідок хвороби та/або терапії

Будь-коли

Тривала підтримуюча терапія

Будь-коли

СОЛІДНІ ЗЛОЯКІСНІ ПУХЛИНИ

Цитотоксична хімієтерапія

Будь-коли

Терапія таргетними препаратами

Будь-коли

Імунотерапія

Будь-коли

Променева терапія

Будь-коли

Хірургічне втручання

за 48 годин до або через 2 тижні після


Як вакцинують проти COVID-19 людей з серйозними порушеннями згортання крові (коагулопатіями)?

Для вакцинації використовують тонку голку (розмір 23G або меншого розміру), після введення вакцини сильно натискають на місце введення (без тертя) протягом щонайменше 2 хв.

Пацієнту або членам сім'ї, батькам **обов'язково повідомляють про ризик розвитку гематоми від ін'єкції.**

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



 **МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ**

**Чи можна мочити місце
введення вакцини,
приймати душ?**

**Приймати душ, приймати ванну
після вакцинації та мочити
місце щеплення можна.**

Головне не терти місце уколу
під час та після приймання душу
або ванни для уникнення
зайвого подразнення.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ


Чи можна їсти жирну їжу до чи після вакцинації від COVID-19?

Режим чи склад вашого харчування ніяк не повинен бути бар'єром для вакцинації проти COVID-19.

Втім, слід пам'ятати, що у деяких людей «важка» їжа може бути причиною болю у животі, нудоти чи блювання, що призведе до порушення вашого самопочуття у післявакцинальний період.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



 **МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ**

Чи можна вживати алкоголь до чи після вакцинації від COVID-19?

Наразі немає підстав вважати, що вживання помірних доз алкоголю впливає на ефективність щеплення проти COVID-19.

Водночас великі дози спиртного пригнічують роботу імунної системи, що може послабити імунну відповідь на вакцину.

МОЗ нагадує, що зловживання міцними алкогольними напоями шкодить здоров'ю людини, незалежно від того, чи збирається вона вакцинуватися.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



Вакцинація
від COVID-19




МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Чи є якісь обмеження щодо фізичних навантажень після вакцинації від COVID-19?

Якщо ви не маєте сильної реакції на щеплення від COVID-19 та відчуваєтеся добре, то ніяких обмежень для тренувань чи інших видів фізичної активності немає. Втім, слід пам'ятати, що надмірні навантаження шкодять здоров'ю, та прислухатися до свого організму.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



 **МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ**

Чи можна подорожувати літаком після вакцинації?

Так, подорожувати літаком можна.

Медичні експерти вважають, що немає підстав для занепокоєння, що щеплення проти COVID-19 може вплинути на ризик виникнення тромбозів під час повітряних подорожей.


Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua




МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

COVID-19 швидко поширюється у закритих приміщеннях, коли люди невакциновані та без масок

**Вчитель
із симптомами
хвороби
працював
протягом
2 днів
без маски**



**12 із 24 дітей
захворіли**



**Заклади освіти можуть
запобігти поширенню
COVID-19 за умови:**



вакцинації
працівників
18+



правильного
носіння
маски



дотримання
дистанції та
гігієни рук



самоізоляції
в разі
симптомів
хвороби

Вакцинація освітян у світі:

90%  

в Італії та США

80% 

у Франції

75% 

у Греції



ЗЕЛЕНИЙ РІВЕНЬ (ВСЯ УКРАЇНА)

- обов'язкове носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті

ЖОВТИЙ РІВЕНЬ (ВСЯ УКРАЇНА)

Обов'язкове носіння маски в громадських приміщеннях та громадському транспорті, дотримання дистанції в 1,5 м

Заборонено:

- масові заходи за участю більше 1 особи на 4 кв. метри площі будівлі або території
- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць
- заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів
- робота закладів освіти, крім тих, де не менше 80% працівників мають жовтий або зелений COVID-сертифікат

Обмеження не будуть застосовуватися у разі наявності у понад 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів чи заходів, крім осіб до 18 років, жовтих або зелених COVID-сертифікатів

ПОМАРАНЧЕВИЙ РІВЕНЬ (РЕГІОН)

- обмеження та норми жовтого рівня
- місцева влада може вводити додаткові обмеження

ЧЕРВОНИЙ РІВЕНЬ (РЕГІОН)

Обов'язкове носіння маски в громадських приміщеннях та громадському транспорті, дотримання дистанції в 1,5 м

Заборонено:

- робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на винос
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів
- робота закладів освіти, окрім закладів, де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат
- проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів
- робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки
- робота закладів, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі тощо)

Обмеження не будуть застосовуватися у разі наявності у всього персоналу та всіх відвідувачів закладів чи заходів, крім осіб до 18 років, зелених COVID-сертифікатів

Жовтий COVID-сертифікат

Коли можна отримати?

Після першого щеплення дводозною вакциною від COVID-19

Де можна отримати?

На платформі ДІЯ: цифровий у вашому смартфоні, паперовий* - завантажити з порталу та надрукувати (інструментарій у розробці)

Скільки буде діяти?

120 днів від моменту щеплення

*друкувати можна не кольоровим на звичайному білому папері, головне чітко видимий QR-код

Зелений COVID-сертифікат

Коли можна отримати?

Після другого щеплення дводозною вакциною від COVID-19 або з 14-го дня після щеплення одностозною вакциною від COVID-19

Де можна отримати?


На платформі ДІЯ: цифровий у вашому смартфоні, паперовий* - завантажити з порталу та надрукувати (інструментарій у розробці)

Скільки буде діяти?

365 днів

*друкувати можна не кольоровим на звичайному білому папері, головне чітко видимий QR-код

Скільки країн визнають вакцини від COVID-19 для подорожей*



* Дані: VisaGuide.World станом на 27.08.2021



Марго Марго

15 ч. · 🌐

100%Мотивація:

Пам'ятайте, якщо ми покладемо вас в нашу реанімацію - всі ваші речі та телефон віддаються другій половині... І так будуть вичислені всі коханці та коханки...

Тому, щоб не палитись ВАКЦИНУЙТЕСЬ
(з просторів ФБ) 🤔💉🤔



*Дякую
за
увагу!*